



香港大學民意研究計劃

女士對乳房檢查及 乳癌認知意見調查

彭嘉麗小姐

香港大學民意研究計劃助理總監

2013年9月24日

研究背景



- 香港癌症基金會於2013年8月委託香港大學民意研究計劃(民研計劃)進行是次《女士對乳房檢查及乳癌認知意見調查》，主要目的為瞭解本港女性檢查乳房的習慣和意見，以及對乳癌的認知。
- 調查問卷由民研計劃諮詢香港癌症基金會後獨立設計，所有操作、數據收集及分析由民研計劃獨立進行，結果亦由民研計劃全面負責。
- 調查方法和結果全面公開。

樣本資料



訪問日期：	2013年8月27至9月2日
訪問對象：	18歲或以上並操粵語的香港女性
調查方法：	由 <u>女性訪員直接進行電話訪問</u> ，訪員在成功接觸目標住戶後，再從住戶內找出一位符合條件的女士接受訪問。
樣本數目：	<u>509</u> 個成功個案
有效回應比率：	71.8%
抽樣誤差：	在95%置信水平下，少於 <u>+/- 4.4</u> 個百分比


The background features several overlapping, hand-drawn style orange lines that form abstract, organic shapes, possibly resembling stylized leaves or petals. These lines are thin and light in color, creating a subtle, decorative pattern on the left side of the page.

調查結果




女性檢查乳房的習慣

六成被訪女士表示有定期做乳房檢查



[Q1] 請問你有冇定期做乳房檢查?


當中，逾五成表示會自行檢查乳房及找醫生檢查



基數：303

[Q2] [只問Q1表示“有”的被訪者，基數=303] 咁你係自行檢查定係搵醫生檢查？


有自我檢查乳房的被訪者中 逾四成不定期進行，平均每三星期進行一次



基數：241

[Q3] [只問Q2表示“只會自行檢查”或“兩項都有”的被訪者，基數=242] 你會隔幾耐進行一次自我乳房檢查呢？


有找醫生檢查乳房的被訪者中 逾四成每年進行一次，平均接近兩年進行一次



基數：223

[Q4] [只問Q2表示“只會找醫生檢查”或“兩項都有”的被訪者，基數=223] 你會隔幾耐搵醫生進行一次乳房檢查呢？


有關被訪者最常找醫生進行的是臨床檢查 其次為乳房X光造影



基數：223

[Q5] [只問Q2表示“只會找醫生檢查”或“兩項都有”的被訪者，基數=223] 咁你搵醫生做過以下邊項乳房檢查？ [訪員讀出1-5項，次序由電腦隨機排列，可選多項]

被訪女士沒有進行自我乳房檢查的主因是 認為沒有需要及不會發生在自己身上




基數：265

[Q6] [撇除Q1表示“有”或Q2表示“只會自行檢查”或“兩項都有”的被訪者，基數=267] 點解你有進行自我乳房檢查呢? [不讀答案，可選多項]

被訪女士沒有找醫生進行乳房檢查的主因同樣是認為沒有需要及不會發生在自己身上



首十位




[Q7] [撇除Q1表示“有”或Q2表示“只會找醫生檢查”或“兩項都有”的被訪者，基數=286] 點解你有搵醫生進行乳房檢查? [不讀答案，可選多項]



女性對檢查乳房的意見


最多被訪者認為乳房發育後 便應該開始進行自我乳房檢查



基數：509

[Q8] 一般黎講，你認為女士應該幾時開始進行自我乳房檢查? [不讀答案，可選多項]


近兩成被訪者認為女性應從40歲後開始進行乳房X光造影檢查，亦有近四分一表示不知道



基數：509

[Q9] 咁你認為女士應該幾時開始進行乳房X光造影檢查 (Mammogram) 呢? [不讀答案，可選多項]

更多被訪者不知道女性應何時開始進行超聲波掃描或磁力共振掃描，另有一成六表示當發現有乳癌徵狀時開始




基數：509

[Q10] 咁你認為女士應該幾時開始進行超聲波掃描 (Ultra-sound) 或磁力共振掃描 (MRI) 檢查呢? [不讀答案，可選多項]

The background features several overlapping, hand-drawn style orange lines that form abstract, organic shapes, possibly resembling stylized leaves or petals. These lines are thin and create a sense of movement and depth.

女性對乳癌的認知

近八成被訪者知道乳癌最常見的症狀為 乳房有硬塊、出現凹陷




基數：509

[Q11] 以你所知，乳癌有啲咩常見嘅症狀? [不讀答案，可選多項]

各有逾三成正確知道家族遺傳及不良飲食習慣 / 缺乏維他命會增加患乳癌的機會



首十位




基數：507

[Q12] 你認為有咩因素會增加患上乳癌嘅機會? [不讀答案，可選多項]

最多被訪者認為每月定期做自我檢查及 培養良好飲食習慣能預防及減低患上乳癌的風險



首十位




[Q13] 你認為有咩方法能夠預防及減低患上乳癌嘅風險? [不讀答案，可選多項]

The background features several overlapping, hand-drawn style orange lines that form abstract, organic shapes, possibly resembling stylized leaves or petals. These lines are thin and light in color, creating a subtle, artistic frame for the text.


被訪者個人資料

年齡




基數：508

學歷




基數：508

職業



基數：506

每月個人收入



基數：490

The background features several overlapping, hand-drawn style orange lines that form abstract, organic shapes, resembling stylized leaves or petals. These lines are thin and light in color, creating a subtle, decorative pattern on the left side of the page.

總結

總結



- 結果顯示，六成被訪女性有定期做乳房檢查，當中五成同時有**自行檢查及找醫生檢查乳房**，平均每隔3個月及1.8年便進行一次，而被訪者最常找醫生進行的是**臨床檢查**。
- 被訪女性沒有定期自我進行檢查及找醫生檢查的主因同樣是**沒有需要及認為不會發生在自己身上**。
- 較多被訪女性認為**乳房發育後**便應開始進行自我乳房檢查；**40歲後**便應開始進行乳房X光造影檢查；而**當發現有乳癌徵狀時**便應開始進行超聲波掃描或磁力共振掃描。
- 最多被訪女性知道乳癌最常見的症狀為**乳房有硬塊、出現凹陷**；而**家族遺傳及不良飲食習慣 / 缺乏維他命**則會增加患乳癌的機會。她們亦認為**每月定期進行自我檢查及保持良好飲食習慣**是預防及減低患上乳癌風險的最佳方法。

The background features several overlapping, hand-drawn style orange lines that form abstract, organic shapes, possibly resembling stylized leaves or petals. The lines are thin and vary in color from light to a slightly darker shade of orange.

報告完畢

詳細報告結果，請瀏覽

<http://hkupop.hku.hk>